



Ordre : *Agaricales*

Famille : *Secotiaceae*

***Lepiota cristata*** (Bolton : Fr.) P. Kumm.

Nom français : Lépiote crêtée

En forêt, lisière, taillis. Chapeau couvert d'écailles ochracées à brun orangé sur fond blanchâtre, calotte plus vivement colorée. Lames blanches. Stipe blanc rosâtre portant un anneau assez ample, mais fragile. Odeur typiquement vireuse ou de caoutchouc. Spores 6-8 x 3-4 µm, légèrement éperonnées.

A comparer avec :

- *L. cristatoides* et *L. apatelia* : véritables sosies, anneau rudimentaire, petites spores ovoïdes ;
- *L. hymenoderma* : anneau nul, arête des lames garnie de cystides clavées à étranglées ou subcapitées, petites spores ovoïdes ;
- *L. saponella* : sous *Cupressus*, odeur de savonnette, spores éperonnées.

Espèce fréquente et typique dans toutes sortes de milieux, elle est bien présente chaque automne, parfois dès l'été lorsque les conditions météorologiques sont favorables. A noter page 2 quelques récoltes d'exemplaires assez trompeurs.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 3.



Plusieurs récoltes ici qui pourraient rappeler quelques variétés, lesquelles sont de moins en moins reconnues et donc rapprochées de l'espèce type :

- en haut à gauche : *L. cristata* var. *felinoides* avec des teintes sombres rappelant *L. felina* ;
- ci-dessus : *L. cristata* var. *pallidior* aux couleurs pâles ;
- ci-contre : *L. cristata* var. *exannulata* avec un stipe dépourvu d'anneau, celui-ci étant tout simplement resté accroché à la marge du chapeau.



