



Ordre : *Hericiales*

Famille : *Auriscalpiaceae*

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner

Synonyme : *L. ursinus* ss. P.-A. Moreau, P. Roux et G. Mascarell (Bull. FMDS 162, ss. Flore analytique des champignons supérieurs de Kühner & Romagn.

Généralement sur feuillus. Chapeau bombé puis plat, couvert d'un feutrage pâle et rapidement brun-rouge (moins hirsute chez la forme *ochropallidus*, cf. pages 2 et 3). Lames beiges, arête serrulée. Chair douce à légèrement amère. Spores 3,5-4,5 x 3-3,5 µm. Présence d'hyphes dans la chair montrant des bosses proéminentes et caractéristiques, faciles à observer dans le melzer.

A comparer avec les espèces proches du même genre (attention aux noms différemment interprétés selon les ouvrages).

Cette espèce n'est pas fréquente, nous l'avons néanmoins observée dans de nombreuses forêts de la région, parfois dès le mois de juillet et plus généralement l'automne, voire jusqu'en janvier. Nous remercions vivement M. P.-A. Moreau pour ses nombreuses explications et ses éclaircissements en matière de bibliographie.

Biblio : Petersen, R. H. & Hughes, K. W. (2004), a preliminary monograph of *Lentinellus*.

Fiche réalisée en février 2024 par Patrice TANCHAUD



