



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

Cheilymenia fraudans (P. Karsten) Boudier

Synonyme : *Neottiella fraudans*

Plutôt sur excréments d'animaux domestiques. Apothécies 1-3(5) mm. Hyménium orange. Spores 14-20 x 11,5-13,5 µm, subglobuleuses, avec la paroi et les verrues cyanophiles. Poils de la marge atypiques pour le genre, particulièrement courts et peu cloisonnés, difficiles à observer.

A noter quelques différences dans la littérature de référence : Doveri (spores 14-16,8 x 11,5-13,6 et poils non ou uni-cloisonnés) ; Moravec (spores 15,5-19,5 x 12-13,5 µm et poils plus cloisonnés).

Avec des spores également subglobuleuses et finement ponctuées, à comparer avec :

- *C. dennisii* : présence très nette de poils typiques du genre ;
- *C. stercoraria* : rare espèce, poils absents, ou seulement quelques-uns avortés.

Ascomycète probablement peu fréquent. Notre récolte a été réalisée en février 2018, sur crottin de cheval à Ste Gemme. Les observations microscopiques se sont avérées être nettement plus conformes à la description de Doveri, tant par les spores mesurant 15-16 x 11,5-12,8 µm que par les poils non ou peu cloisonnés, difficiles à observer et mis en valeur dans le bleu de crésyl.

Biblio : A world monograph of the genus *Cheilymenia* J. Moravec - Doveri Fungi fimicoli Italici.