



Ordre : Cortinariales

Famille : Inocybaceae

Inocybe brunneotomentosa Huijsman

Sous feuillus herbeux. Chapeau brun ochracé, brunâtre, feutré-squamuleux. Lames beiges. Stipe pruveux au sommet, blanchâtre mastic, et brunissant dans la moitié inférieure. Odeur spermatique à terreuse selon les ouvrages. Spores 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides courtes ne dépassant pas 50 µm à parois épaisses.

Nous connaissons cette espèce à Port d'Envaux où nous avons observé de nombreux exemplaires en août 2011, en forêt de feuillus. L'odeur nous rappelait plus celle d'*Inocybe tenebrosa* (banane), taxon dont les caractères macroscopiques correspondent à cette récolte (en particulier le brunissement du stipe). Les caractéristiques microscopiques, notamment les cheilocystides très courtes (30-50 µm), les spores 7-9,5 x 4,5-5,5 µm et les caulocystides uniquement sommitales, nous ont conduit au taxon piège présenté ici. Nous remercions MM Patrice Lainé et Alain Ferville pour l'aide apportée à la détermination de cette récolte.

Biblio : Inocybe J. Stangl - DM n°108 p.51

Fiche réalisée en avril 2015 par Patrice TANCHAUD

