



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

## *Octospora humosa* (Fr.) Dennis

Parmi les mousses, surtout du genre *Polytrichum*. Apothécies 3-10 mm, orangées. Spores 18-23 x 11-13 µm, elliptiques à subcylindriques avec une à deux grosses gouttes et de nombreuses gouttelettes. Asques octosporiques. Paraphyses généralement courbées au sommet.

A noter l'existence d'un taxon difficile à cerner et controversé : *O. humosa* var. *anthracobia* (cf. les discomycètes de Grelet), qui se distinguerait par son habitat carbonicole et une taille moindre. Gageons que nous en saurons probablement plus dans l'avenir, car il semblerait que nous soyons là dans un complexe de plusieurs espèces en cours d'étude.

Ascomycète peu fréquent, nous l'avons rencontré l'automne et l'hiver, par exemple dans les secteurs de Ste Gemme et Fenioux.

Remarques sur deux récoltes :

- page 3 : décembre 2012 parmi les *Funaria* dans un lieu brûlé à Montendre, le nom d'*O. humosa* var *anthracobia* peut être tentant ...
- page 4 : janvier et février 2018, plusieurs centaines d'exemplaires dans un lieu incendié sur la commune de Jussas, les spores étaient uniguttulées à 99%.

Biblio : Bull. Société Hist. Nat. du Doubs 1988-1989 84 (clé de détermination du genre *Octospora* et genres voisins par Michel Caillet & Gilbert Moyne) - Boudier icône n° 391.





