



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Hymenogasteraceae*

Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet

Nom français : Hébélome croûte de pain

En forêt de feuillus ou conifères. Silhouette robuste. Chapeau ochracé pâle, marge blanchâtre. Lames blanchâtres puis beiges, arête exsudant des gouttelettes limpides, puis brunes. Stipe blanc, floconneux. Odeur de rave, saveur raphanoïde et légèrement amère. Spores 9,5-13 x 5-7 µm, finement verruqueuses, non dextrinoïdes. Cheilocystides à apex peu élargi. A comparer avec :

- *H. eburneum* : apex des cheilocystides plus large ; - *H. geminatum* et *H. aanenii* : peu connus et récemment décrits (2018), spores plus petites.

Voir également quelques espèces généralement moins robustes :

- *H. velutipes* : spores nettement dextrinoïdes ; - *H. fragilipes* : spores nettement verruqueuses et assez nettement dextrinoïdes ;

- *H. hiemale* : spores nettement verruqueuses et non ou peu dextrinoïdes.

Des études récentes montrent que nous sommes là dans un complexe d'espèces impossibles à distinguer sans un recours à la microscopie, cet hébélome semble néanmoins fréquent dans la région, souvent en assez grand nombre chaque automne.

Biblio : littérature courante - The Genus *Hebeloma* Jan Vesterholt - Fungi Europaei 14 Beker, Eberhardt & Vesterholt (2016) - GEPR.