



Ordre : *Amanitales*

Famille : *Amanitaceae*

Amanita echinocephala (Vitt.) Quélet

Nom français : Amanite épineuse

Sous feuillus et conifères. Calcicole thermophile. Chapeau blanchâtre, verrues du chapeau pyramidales aiguës, régulièrement réparties avant leur chute. Lames blanc grisâtre à glauque verdâtre. Stipe concolore couvert en bas de verrues. Anneau ample à bord crénelé. Spores 8-11 x 6-8 μm .

A comparer avec :

- *A. echinocephala* var. *subbeillei* : lames beige saumoné ;
- *A. gracilior* : verrues du chapeau moins régulièrement réparties et plus concentrées au centre (espèce de taille parfois respectable contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, et à ce qui est indiqué dans la littérature, cf. cette fiche).

A noter l'existence d'une rare espèce parasite, *Squamanita schreieri*, qui se développe parfois sur cette amanite (également sur *A. strobiliformis*), son chapeau est jaune orangé et squamuleux.

Cette amanite (type) semble moins fréquente que sa var. *subbeillei*, du moins dans notre région.

Biblio : littérature courante - Neville et Poumarat (1995) Bull. FAMM 7-8 et (1996) Doc. Mycol. 26 (101).



