



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

Otidea minor (Boud.) Olariaga & K. Hansen

Synonyme : *O. cantharella* var. *minor*

Au sol, sous conifères ou feuillus. Apothécie 1-4 cm, cupuliforme à plus ou moins en forme d'oreille, généralement fendue latéralement et stipitée. Hyménium ocre clair à gris jaunâtre. Face externe jaune à jaune ochracé avec l'âge, avec quelques veines ou plis à la base de quelques apothécies. Spores (10)10,5-12,5(13) x (4,5)5-5,5(6,2) µm, oblongues. Paraphyses droites à coudées légèrement clavées au sommet.

A comparer avec les espèces du même genre, notamment :

- *O. concinna* : spores subtilement plus larges donc avec un Qm (Quotient moyen) légèrement plus faible (cf. cette fiche) ;
- *O. phlebophora* : plis nettement prononcés formant des côtes anastomosées sur toutes les apothécies.

Nous avons observé cette otidée en 2016 et 2017 durant les mois d'été et d'automne, sous épicéas sur la commune de Chermignac. Il ne faisait guère de doute, après étude, que nous étions dans le groupe d'*O. concinna*. C'est en confiant des exemplaires à M. François Valade et au Museum National d'Histoire Naturelle de Paris (projet Funif-Col), que nous remercions vivement, que le séquençage réalisé a permis de nommer définitivement cette récolte.

Biblio : Boudier, planche n° 326 - Persoonia 35, 2015.

