



Ordre : *Cantharellales*

Famille : *Cantharellaceae*

Craterellus undulatus (Pers.) E. Campo & Papetti

Synonymes : *Pseudocraterellus undulatus*, *C. sinuosus* (+ *var. pusillus*)

Nom français : Chanterelle sinueuse

En forêt de feuillus. Chapeau irrégulier, brun foncé puis grisâtre à blanchâtre par l'hygrophanéité, marge sinuée. Hyménium plus ou moins ridé, grisâtre. Stipe concolore au chapeau. Spores 8,5-12,5 x 6-8,5 µm.

Les exemplaires très crispés sont parfois baptisés *C. sinuosus var. crispus*, variété qui entre dans la variabilité de l'espèce.

C. pertenuis, tel que décrit par exemple par Jülich (Guida alla determinazione dei funghi vol. 2), serait une très petite espèce à chapeau 2-6 mm et spores 7,5-9,5 x 4-5,5 µm, mais avec des dimensions sporales entrant dans la fourchette de *C. sinuosus*, il pourrait s'agir « tout simplement » de jeunes ou petits exemplaires, binôme d'ailleurs non retenu ou évoqué dans la littérature récente...

Nous avons pu remarquer que cette petite chanterelle n'est pas visible tous les ans. Par contre, lorsque les conditions lui conviennent, elle peut être observée dans différents secteurs, entre les mois de juillet et de novembre.

Biblio : littérature courante - Bollettino C.M. "G. Carini", 81, 2021.

Fiche réalisée en avril 2024 par Patrice TANCHAUD







