



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Coprinellus heterothrix (Kühner) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Synonyme : *Coprinus heterothrix*

Nom français : Coprin sétuleux

Sur terre ou au voisinage de bois mort. Chapeau jusqu'à 2cm, sillonné presque jusqu'au milieu, pubescent par la présence de soies, et voile présent sur les jeunes exemplaires. Lamelles distantes. Stipe blanc. Spores 8-11 x 5-6 µm à pore germinatif central ou excentré. Voile filamenteux ramifié et présence de soies (pilécystides) à apex parfois élargi ; cheilocystides lagéniformes. A comparer notamment avec *C. impatiens*, *C. hiascens* et *C. velatopruinatus*.

Ce coprin n'est peut-être pas très rare mais pas toujours facile d'identification vu l'ensemble des caractères microscopiques qui doivent être réunis, de jeunes exemplaires sont donc indispensables pour permettre l'observation du voile et des cystides. Nous avons deux récoltes personnelles de cette espèce, réalisées sur les communes de La Gripperie et Champagne (juin 2010), ainsi qu'une troisième par notre collègue Robert Lagarde en provenance de Graves (16) (juillet 2010).

Biblio : Littérature courante - Studies in Coprinus d'Ulje - Ehrhard Ludwig, Pilzkompendium Band 1 - DM n° 86 (juin 1992) et n° 95 (oct. 1994) tome 24 (clés du genre Coprinus par M. Citérin) - BK4 282.

