



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Mycenaceae*

## *Mycena maculata* Karsten

Fasciculé sur bois en décomposition de feuillus ou de conifères. Chapeau brunâtre à brun rougeâtre, plus ou moins maculé de brun rouge avec l'âge. Lames gris rosâtre tachées de brun-rouge. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur et saveur sans particularité. Spores 8-10 x 5-6,5 µm, cheilocystides ramifiées. Cette espèce est assez trompeuse car l'épithète spécifique (*maculata*) peut donner la fausse impression que les spécimens sans taches appartiennent à une autre espèce, en particulier en présence de jeunes exemplaires non encore maculés. A comparer avec quelques mycènes de la même section :

- *M. atrochalybaea* : bien délicat à séparer, indiqué sur épicéa ;
- *M. hemisphaerica* : semble se distinguer des autres espèces de ce groupe par ses hyphes incrustées de l'épicutis ;
- *M. flos-nivium* : sur conifères, spores subcylindriques moins larges ;
- *M. galericulata* (lorsqu'il se présente sous des formes sombres) : saveur farineuse, hyphes de l'épicutis nettement plus diverticulées et spores plus grandes.

Espèce peu fréquente selon nos observations que nous ne rencontrons qu'occasionnellement l'automne, à ce jour uniquement sur bois de feuillus. A noter que *M. vitilis*, espèce très fréquente, présente parfois des taches rouillées sur le chapeau et les lames, elle pousse de façon solitaire, au plus deux ou trois ensemble, sur brindilles et débris de feuillus au sol, ses spores sont légèrement plus grandes.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich, p. 507 - Pilzk. 3.

*Fiche réalisée en avril 2019 par Patrice TANCHAUD*