



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucoagaricus tener (Orton) Bon

Dans les endroits frais en forêt de feuillus ou dans les milieux rudéralisés. Chapeau finement méchuleux de brun fauvâtre sur fond blanc, plus ou moins avec quelques gouttes ambrées, centre plus sombre. Lames blanches. Stipe blanchâtre exsudant souvent des gouttes ambrées dans la jeunesse, anneau fragile. Spores 5,5-8 x 4-5 μm .

A comparer par exemple avec :

- *L. melanotrichus* : chapeau méchulo-ponctué de gris noirâtre, parfois avec quelques gouttelettes ;
- *L. gauguei* : moins fragile, anneau plus résistant, pas de gouttelettes, spores 7-8,5 3,5-4 μm à sommet étiré ;
- *L. brunneocingulatus* : chapeau orangé à rosâtre brun, gouttelettes absentes, hyphes pré-terminales du trichoderme courtes et fortement incrustées, petites spores (5-6 x 3,5-4 μm) ;
- *L. rhodelephantinus* : chapeau brun rosâtre squamulo-écailleux (pouvant rappeler les genres *Lepiota* et *Macrolepiota*), spores 5-6 x 3,2-4,2 μm .

Lépiote probablement rare, que nous avons eu le plaisir de rencontrer à deux reprises, en septembre/octobre sur bois pourrissant en milieux humides, à Montendre et Louzac St André.

Biblio : DM HS n° 3 p. 95 - GEPR.



cheilos