



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella orbitarum (Romagn.) M.M. Moser

Synonyme : *P. prona* f. *orbitarum*

Sur sol, souvent dans les milieux boueux ou les ornières. Chapeau (5)10-15(18) mm, hygrophane, micacé, brun sombre puis brunâtre à brun grisâtre, prenant en séchant des teintes pourpre rosâtre, strié, présence d'un voile fugace. Lames brunâtres, arête des lames rouge à maturité. Stipe blanchâtre ochracé. Spores 9-13 x 5-6,5 µm. Basides majoritairement bisporiques. Cheilocystides et pleurocystides lagéniformes.

Espèce parfois controversée, à comparer avec celles de la Section *Atomatae*, notamment *P. potteri* qui a un chapeau non ou peu strié et des spores plus grandes (12,5-16 x 6,5-8 µm).

Cette petite psathyrelle n'est pas très fréquente, nous l'avons récoltée à plusieurs reprises dans différents secteurs, parfois dès le printemps mais plus souvent l'automne.

Biblio : Fouchier « Le Genre Psathyrella » FAMM 1995 (clés dichotomiques d'après Kits van Waveren) - E. Ludwig, Pilzk. Band 2 - Funga nordica.