



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula albonigra (Krombholz) Fr.

Nom français : Russule blanche et noire

En forêt. Chapeau blanchâtre à brun sale, rapidement taché de noirâtre. Lames blanc ivoire, noircissant avec l'âge ou à la manipulation. Chair blanche, noircissant à la coupe, rougissant faiblement ou pas du tout. Saveur douce typiquement mentholée. Fer vert. Sporée 1a. Spores 7-9 x 6-7 µm, très finement ornementées. Cystides contenant de grandes masses d'aspect huileux, pleurocystides sans réaction dans le réactif SBA (sulfobenzaldéhyde).

A comparer avec :

- *R. atramentosa* : non rougissant, lié aux chênes verts dans la région méditerranéenne, lames plus serrées couleur crème à café au lait, pleurocystides noircissant au contact de SBA ;
- *R. albonigra* f. *pseudonigricans* : nettement rougissant, sosie de *R. nigricans* qui a des lames très espacées ;
- *R. anthracina* var. *insipida* : lames serrées, saveur non mentholée, pleurocystides noircissant au contact de SBA.

Espèce de la section *Compactae*, probablement pas parmi les plus fréquentes de la région, pouvant se rencontrer les mois d'été ou en début d'automne, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari.