



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula ochrospora (Nicolaj) Quadraccia

Sous chênes à feuilles caduques. Chapeau 7-14 cm, lubrifié et brillant, vert bleuté à olivâtre gris, centre crème ochracé à brun rosâtre. Lames lardacées sur exemplaires jeunes et frais, jaunes à maturité. Stipe blanchâtre, brunissant. Odeur fruitée à légèrement désagréable en vieillissant. Gaïac vif, moyennement rapide. Fer subnul, lentement gris vert. Sporée (3b)3c-4a(4b). Spores 8-9 x 6,5-8 µm presque totalement réticulées. Les espèces à comparer et à sporée sombre de la Ss.-section *Griseinae* ne sont pas nombreuses :

- *R. medullata* : sous trembles et bouleaux, sporée 3a-3b, spores à verrues isolées ;
- *R. atroglauc*a : sous trembles et bouleaux, sporée 2b-2c, gaïac nul, spores crêtées ;
- *R. stenotricha* : sous feuillus, sporée 2b-2c, gaïac nul à faible.

Cette russule semble peu fréquente dans la région, à ce jour nous n'avons que quelques récoltes estivales provenant des bois de Lozay, Fontcouverte et Du Douhet A chaque fois, nous avons noté que les lames étaient lardacées, avec une réaction plutôt vive au gaïac mais moyennement rapide, et une sporée codée 3c-4a avec le code Romagnesi.

Biblio : *Russula Sarnari* p. 352.

