

Marennnes, oct. 2014



Chermignac, oct 2015



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius basillaceus P. D. Orton

Sur les bords de mares, d'étangs et de fossés humides. Chapeau 2-6 cm, jaune-fauve à orangé, jaune en séchant, fibrilleux. Lames espacées, fauve orangé. Stipe orangé ochracé, pourvu d'une zone annulaire blanchâtre crème assez fugace ; mycélium lilas plus ou moins présent, parfois absent. Chair jaunâtre dans le chapeau, orangé safrané dans le stipe. Odeur herbacée à raphanoïde, saveur douce. KOH rouge purpurin à violet sombre sur cuticule et chair. Spores 10-12,5 x 5-7 µm.

Les cortinaires de la section *Hinnulei* ne sont pas toujours faciles à distinguer, celui-ci paraît assez typique par son écologie et son mycélium lilas.

Nous avons plusieurs observations se rapportant nettement à ce taxon, il est à noter malgré tout que les spores observées sur la majorité de nos récoltes mesuraient 8,5-10 x 4,5-6 µm.

Bibli : ADC Bidaud et al. hors-série n° 1 planche 7 - GEPR p. 796 (nota).

Fiche réalisée en juin 2024 par Patrice TANCHAUD



Trois récoltes automnales provenant de la forêt de l'Hermitain (79), sur bord de fossé humide avec présence de sphaignes ; l'odeur perçue était nettement celle de rave et les spores mesuraient 8,5-10 x 4,5-5 μm .