



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius decipiens var. atrocoeruleus (Moser) H. Lindstr.

Synonymes : *C. atrocoeruleus*, *C. sertipes*

Surtout sous bouleaux, parfois sous saules, peupliers ou chênes. Chapeau hygrophane, brun-rouge à brun-noir, brun-jaune en séchant, marge appendiculée de voile blanc. Lames jaunâtre beige parfois nuancées de violet. Stipe voilé de gris luisant à gris brunâtre, parfois violet au sommet. Chair blanchâtre, plus ou moins lilacine au sommet du stipe. Odeur et saveur sans particularité. Spores 7-8,5 x 4,5-5,5 µm.

Voir la fiche de *C. saturninus*, taxon ressemblant.

Cette variété diffère du type par la présence de voile sur le chapeau et ses spores plus petites. Nous la connaissons dans différents secteurs de Ste Gemme et La Gripperie St Symphorien, au long des chemins avec bouleaux ou peupliers à proximité. Il est aisé de constater ici la variabilité de ce taxon, plus ou moins sombre avec plus ou moins de voile, ce qui peut laisser penser que parmi les nombreuses espèces gravitant autour de *C. decipiens*, quelques-unes sont probablement superflues, citons par exemple *C. fraternus* dont les différences sont bien difficiles à trouver. A noter page 3, une récolte sous peupliers sur l'île de Ré.

Biblio : ADC Bidaud et al.



