



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Hydnellum fuligineoviolaceum (Kalchbr. in Fr.) Larsson, Larsson & Kõljalg

Synonyme : *Sarcodon fuligineoviolaceus*

Sous conifères (*Abies*, *Picea* and *Pinus*). Chapeau 10-13 cm, brun jaunâtre puis brun bleuté, tomenteux, lisse à faiblement squamuleux. Aiguillons blanchâtres à gris rosé lilacin. Stipe subconcolore au chapeau. Chair pourpre pâle, gris-bleu à bleu-violet, rougeâtre à la base. Saveur très âcre. Spores (4)5-6,5 x 4-5 µm.

Cette espèce est typique, à comparer néanmoins avec :

- *H. roseoviolaceum* : décrit en 2021, véritable sosie connu à ce jour uniquement de Suède sous pins sylvestres, chair rose puis violette, saveur douce, spores 4,3-5,1 µm ;
- *H. joeides* : sous feuillus, chapeau ocre brun à brun-rose, chair rose lilas.

Espèce peu fréquente qui a déjà été observée durant les décennies écoulées. La récolte présentée ici a été réalisée à l'occasion d'une sortie commune, en décembre 2012, dans le secteur de Ronce les Bains, la saveur était nettement poivrée.

Biblio : Walter Jülich Guida alla determinazione dei funghi, Vol. 2° - Cetto n° 2038.