



Ordre : *Thelephorales*

Famille : *Bankeraceae*

Hydnellum joeides (Pass.) Larsson, Larsson & Køljalg

Synonyme : *Sarcodon joeides* (parfois écrit *ioeides*)

En forêt de feuillus. Chapeau feutré, un peu fibrilleux à subsquamuleux, ocre brun à brun-rose, un peu rougeâtre en vieillissant. Aiguillons brun rosâtre. Stipe subconcolore au chapeau, vert sombre à la base. Chair rose lilas, lie-de-vin à violette à la coupe. Odeur farineuse, saveur un peu amère et âcre. Sporée brune. Spores 5,5-6,5 x 4,5-5 µm. Boucles absentes.

A comparer avec *H. fuligineoviolaceum* : tons nettement bleu-violet particulièrement dans la chair, base du stipe rougeâtre.

A noter une ressemblance plus ou moins proche avec quelques espèces du genre *Bankera* (qui se distingue par sa sporée blanche), par exemple *B. cinerea*.

Espèce peu fréquente, nous l'avons observée à quelques reprises à l'intérieur des terres, notamment en Charente (en compagnie de notre ami Robert Lagarde), mais aussi sur le littoral charentais-maritime.

Biblio : BK2 276 - Walter Jülich Guida alla determinazione dei funghi, Vol. 2°.

