



Ordre : Tricholomatales

Famille : Mycenaceae

## *Mycena clavularis* (Batsch : Fr.) Sacc.

Sur bois de feuillus, parfois de conifères. Chapeau 3-6 mm, blanchâtre grisâtre, finement pubescent, couvert d'une pellicule gélatineuse séparable. Lames blanchâtres, espacées. Stipe concolore au chapeau, muni d'un petit disque à la base. Spores 8-11,5 x 7-11 µm. Cheilocystides avec de longues excroissances (observation délicate car difficiles à mettre en valeur et même parfois absentes), et cuticule ramifiée (observation également peu aisée).

Attention à *M. pachyderma* qui ressemble énormément, cette espèce est sans disque basal, ses spores sont similaires mais plus petites, sa cuticule est séparable et ses cheilocystides sont ramifiées.

Seul l'ensemble des caractères microscopiques permet d'identifier cette mycène car elle ressemble également à d'autres telles que *M. adscendens*, *M. corynephora*, *M. tenuispinosa* et dans une moindre mesure à *Phloeomana alba*. Elle semble moyennement fréquente, et à l'image des petites espèces corticoles, elle est à rechercher durant les périodes humides.

Biblio : littérature courante - Mycena d'Europa Robich - Mycena s.l. Aronsen & Laessoe.