



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula rubroalba (Singer) Romagn.

Sous feuillus, surtout sur sol calcaire. Chapeau rouge pourpre à rouge vif, parfois décolorant par plages en rougeâtre cuivré à ocre jaunâtre (totalement crème ochracé jaunâtre chez la variété *albocretacea*). Cuticule peu séparable. Lames crème puis jaunes. Stipe blanc, se tachant de jaune-brun par la base. Chair ferme. Pas d'odeur particulière, saveur douce. Gaïac faible sur stipe et lames. Sporée 4d. Spores 6,5-8,5 x 6-7,5 µm à réseau presque complet.

Seul un ensemble de caractères peut permettre d'aboutir à ce binôme, à comparer par exemple avec deux espèces à sporée identique mais qui possèdent des dermatocystides :

- *R. maculata* : chapeau taché de rouille, spores non réticulées avec quelques connexifs ;
- *R. lutensis* : réaction plus vive au gaïac, spores verruqueuses.

Cette russule semble peu fréquente, nous l'avons rencontrée à deux reprises :

- photographie à gauche : juin 2017 en forêt de La Braconne ;
- photographie à droite : octobre 2022 dans les bois de Nieul les Saintes.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari - GEPR.