



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

Tricholoma quercetorum Contu

Sous chênes. Chapeau jusqu'à 9 cm, d'abord brillant et visqueux (viscosité douce) brun rougeâtre à brun ochracé, plus sombre au centre. Lames blanches, maculées de brun rougeâtre avec l'âge. Stipe couvert de fibrilles rousses sur fond blanchâtre crème, souvent un peu radicant. Chair jaune en bas du stipe. Odeur et saveur très nettement farineuses. Spores 5,5-7 x 3,8-5,4 µm.

A comparer avec :

- *T. ustale* : véritable sosie, souvent sous hêtres, mais parfois sous d'autres feuillus (notamment chênes), chair blanche, odeur et saveur peu farineuses ;
- *T. ustaloides* : viscosité très amère et stipe avec une nette limite annulaire.

Dans la région, ce tricholome est très fréquent dans son écologie, il est visible tous les ans, parfois en grand nombre, particulièrement entre les mois de septembre et de novembre. Il fut longtemps confondu avec *T. ustale*, et donc mal nommé sous ce nom-là.

Biblio : Micologia e Vegetazione Mediterranea 18 (2): 94 - GEPR.

Fiche réalisée en novembre 2017 par Patrice TANCHAUD