



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

## ***Russula laeta*** F.H. Møller & J. Schäffer

Synonyme : *R. borealis*

-

Noms français : Russule gaie, Russule boréale

Sous chênes et hêtres. Chapeau 3-6 cm, rouge pourpré, rouge orangé à rougeâtre plus ou moins cuivré jaunâtre, marge souvent un peu cannelée. Lames crème puis jaune assez vif. Stipe blanc. Odeur légèrement fruitée, saveur douce ou un peu astringente dans les lames. Sporée 4c. Gaïac vif sur stipe et lames. Fer rose orangé pâle. Spores 7,5-9 x 6,5-8 µm avec des épines isolées. Présence de dermatocystides incrustées. Voir la fiche de *R. lutensis* pour les espèces aux couleurs plus ou moins similaires. Avec une sporée identique ou proche, une saveur douce et un gaïac vif, nous ajouterons :

- *R. tinctipes* : chapeau rouge-rose brillant et stipe teinté de rose, cystides incrustées absentes ;
- *R. impolita* : sporée 4a-4b, cystides incrustées absentes.

Cette russule semble peu fréquente, nous l'avons récoltée à quelques reprises, toujours avec présence de chênes, par exemple dans les secteurs de Soulignonne, Saintes et Pessines.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - Russula Sarnari - GEPR.