



Ordre : Schizophyllales

Famille : Porotheleaceae

Phloeomana speirea (Fr.) Redhead

Synonyme : *Mycena speirea*

Nom français : Mycène groupée

Sur débris de feuillus, parfois au sol. Chapeau longuement strié, ochracé à gris brunâtre, centre plus sombre. Lames blanchâtre crème, décourrentes. Stipe crème. Spores 6,5-11 x 4-6 µm.


A comparer avec d'autres mycènes corticoles (cf. fiche *P. hiemalis*) auxquelles nous ajouterons *Mycena clavata* (syn. *M. phaeophylla*), rare espèce qui pousse surtout sur conifères, possède des lames décourrentes ochracées et des spores subglobuleuses.

Il existe également une variété *camptophylla* qui se distingue par un stipe jaune et une forme *candida* (voir page 2) qui est totalement blanche, nous les regroupons sur cette même fiche.

Espèce fréquente et visible à tous moments de l'année lorsque les conditions sont favorables, mais plus particulièrement l'automne.

Biblio : littérature courante - *Mycena* d'Europa G. Robich.





Ci-contre : *Mycena speirea* f. *candida*, forme blanche non placée officiellement dans le genre *Phloeomana*. Récoltes qui diffèrent du type uniquement par leur couleur blanche, réalisées l'été sur débris de feuillus.

Ci-dessus et page suivante : aspects non typiques de l'espèce type.

