



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Rheubarbariboletus armeniacus (Quélet) Vizzini et coll.

Synonyme : *Xerocomus armeniacus*

Nom français : Bolet abricot

Surtout sous feuillus. Chapeau généralement rose, mais parfois rose rougeâtre à orangé ochracé. Pores jaunes puis verdâtres, bleuisant à la manipulation. Stipe jaunâtre puis subconcolore au chapeau. Chair jaunâtre, orangé rhubarbe à la base du stipe, bleuisant légèrement au-dessus des tubes et au sommet du stipe mais **jamais à la base**. Spores 11-14 x 4,5-5 µm. A comparer notamment avec :

- *Hortiboletus rubellus* : base du stipe typiquement piquetée de rouge orangé, bleuissement de la chair nul ou faible dans le chapeau ;
- *R. persicolor* : espèce surtout méditerranéenne venant sous chênes, chapeau terni de gris-brun olivâtre, stipe jaune vif au sommet et rougeâtre uniquement à la base, chair bleuisant vivement, base du stipe jaune safran vif en séchant.

Ce bolet n'est pas rare dans la région, nous l'observons assez régulièrement l'été et l'automne, aussi bien sur le littoral qu'à l'intérieur des terres. A noter également l'existence de *X. armeniacus* var. *sordescens* (cf. cette fiche), variété sans existence officielle mais décrivant un bolet assez fréquent.

Biblio : littérature courante - Xerocomus H. Ladurner & G. Simonini - GEPR.

Fiche réalisée en août 2023 par Patrice TANCHAUD





