



Ordre : Cortinariales

Famille : Bolbitiaceae

## *Conocybe semiglobata* Kühner & Watling

Synonymes : *C. tenera* f. *semiglobata*, *C. affinis*

Souvent dans les milieux herbeux, parfois dans la litière d'aiguilles ou de feuilles. Chapeau 5-25 mm, hygrophane, brun jaunâtre à brun ochracé. Lames ocre puis brunes. Stipe finement pruineux, blanchâtre à orangé, avec la base blanche bulbeuse. Spores (9)10,5-14(16) x (5,5)6-8(9)  $\mu\text{m}$ . Cheilocystides et caulocystides lécythiformes avec capitule 2-5  $\mu\text{m}$ , présence de quelques piléocystides.

- Récolte ci-dessus réalisée en septembre 2009 dans un pré à proximité de Sainte. Seule la microscopie a pu permettre de mettre un nom tant cette espèce est d'aspect banal pour le genre. Les spores contrôlées mesuraient 11-12 x 6-7  $\mu\text{m}$ .
- Récolte page 2 réalisée dans une pelouse à Soullignonne, les spores mesuraient 12-13,5 x 7-7,2  $\mu\text{m}$

Biblio : Funga nordica - Conocybe, Pholiotina, A. Hausknecht.

