



Ordre : *Boletales*

Famille : *Boletaceae*

Suillellus luridus (Schaeff. : Fr.) Murrill

Synonyme : *Boletus luridus*

Nom français : Bolet blafard

En forêt, dans les parcs, etc. Chapeau velouté, brun rosâtre, parfois olivâtre ou rouge. Pores jaunes, rapidement rouge orangé, bleuissants. Stipe jaune orangé plus ou moins marqué d'un réseau rouge, avec des mailles s'étirant souvent largement vers le bas. Chair montrant généralement et typiquement une ligne rouge juste au-dessus des tubes, dite ligne de Bataille (nom du mycologue ayant découvert ce caractère), base du stipe rouge betterave. Spores 11-13,5 x 5-6 µm. Bolet très variable, d'où un certain nombre de variétés qu'il est possible de trouver dans la littérature (bien résumées dans le GEPR4). Voir par exemple en page deux ce qui semble présenter la *var. erythroteron*, nous y comparons également quelques taxons proches.

Cette espèce est très fréquente. Nous la rencontrons dès le mois de juin, puis généralement les mois d'été dès l'instant où les conditions météorologiques sont favorables, et jusqu'en novembre.

Biblio : littérature courante - GEPR.



Photographie à gauche : *B. luridus* var. *erythroteron* (variété non basculée validement dans le genre *Suillellus*).

S. luridus, à comparer avec :

- *S. queletii* : aucun réseau sur le stipe, base du stipe très nettement pourpre betterave ;
- *S. mendax* (possible synonyme de *B. caucasicus*, binôme devenu ambigu), mixte de trois espèces : chapeau rougeâtre et stipe plutôt rouge avec un réseau souvent mal défini limité au sommet (aspect *S. luridus*), base du stipe rouge betterave (aspect *S. queletii*), bas stipe ponctué (aspect *N. erythropus*) ;
- *S. atlanticus* : sous pins maritimes et cistes, chapeau rose orange à jaune saumoné, stipe jaune vif, rouge-pourpre à la base couvert d'un réseau orange ;
- *S. comptus* : méditerranéen, fin réseau au sommet du stipe qui à la base pointue peu teintée de couleur betterave.







