



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Pleurotaceae*

Resupinatus europaeus Consiglio & Setti

Synonymes : *Hohenbuehelia albonigra*, *Resupinatus alboniger* ss. auct.

Sur bois mort. Chapeau velouté, prineux, blanchâtre puis grisâtre. Lames blanches, noircissantes. Stipe subnul. Spores 6-8 x 3-3,5(4) µm, courbées.

Le noircissement des lames est assez typique du taxon présenté ici, à comparer néanmoins avec trois espèces sosies :

- *R. alboniger* : réservé pour des récoltes du continent américain ;
- *R. americanus* : surtout connu également sur ce continent, mais découvert par exemple dans le Cantal et le Jura sur sapin et cèdre, surface gris noirâtre souvent légèrement bleutée couverte de méchules blanchâtres, spores 5,5-6,5 x 2,5-3 µm, cylindro-elliptiques non ou peu courbées ;
- *R. niger* (syn. *H. horakii*) : sur chêne vert, présence de cystides métuloïdes, spores 6-7,5 x 3,7-4,6 µm.

Assez fréquent dans notre région sur bois de feuillus, parfois aussi sur conifères, également observé sur tige de roseau (photographie ci-dessus à droite), notamment durant les mois d'automne et d'hiver sur la période septembre à février, tant à l'intérieur des terres que sur le littoral.

Biblio : I generi *Hohenbuehelia* e *Resupinatus* in Europa Consiglio & Setti.





