



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

Cortinarius glaphurus Chevassut & R. Henry

Synonymes : *C. tubulosus*, *C. cedriosmus*, *C. violaceolens*, *C. paranomalus*

Sous feuillus ou conifères. Chapeau 15-35 mm, brun sombre à brun-fauve, recouvert d'un léger voile blanc grisâtre. Lames brun violacé à brun rougeâtre. Stipe couvert de fibrilles blanches formant un anneau cotonneux, concolore au chapeau par détersion. Chair beige rougeâtre, creuse dans le stipe à maturité. Odeur de bois de cèdre, ou florale rappelant la violette. Spores 8-10 x 4,5-6,5 µm.

Ce cortinaire semble trouver sa place aujourd'hui dans la Section *Bicolores*, Ss.-section *Saturnini*. Sur le terrain, l'odeur caractéristique a attiré notre attention ; elle a ensuite nettement guidé notre choix de détermination, les autres caractères ne paraissant pas incompatibles. Notre récolte a été réalisée en octobre 2019, en milieu herbeux à proximité de chênes verts sur sol calcaire.

Biblio : DM 47 p. 78 (1982) - ADC Bidaud et al. - Persoonia vol. 39, 2017.

Fiche réalisée en juin 2024 par Patrice TANCHAUD