



Ordre : Pezizales

Famille : Morchellaceae

Morchella elata Fries

Synonymes : *M. costata*, *M. importuna* ss. auct. (binôme aujourd'hui reconnu et distingué pour le continent américain).

Parmi les écorces, dans les vergers, sur terreau, sur places à feu, vieux journaux, anciens murs, etc. Chapeau allongé, brun, brun-noir à fauve olivâtre, avec des alvéoles pouvant être bien alignés (pouvant rappeler les mailles d'un pull-over), mais parfois aussi très irréguliers, avec le sommet des côtes généralement noircissant. Stipe blanchâtre crème. Spores 20-22 x 12-13 µm.

Il s'agit d'une morille cultivée un peu partout dans le monde. A ce jour, nous l'avons rencontrée sous pommiers, poiriers, pins et parfois sur places à feu (pages 2 & 3)..

Biblio : Bull. SMF 126, 2010 - Mycologia 104(5): 1172, 2012.

Fiche réalisée en août 2024 par Patrice TANCHAUD









Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 sous pommiers, pourrait faire penser à *M. eximia*, taxon méditerranéen ; mais nous sommes probablement en présence d'une forme de *M. importuna*, comme nous le confirme M. Philippe Clowez, spécialiste du genre.



Ci-contre : récolte réalisée en avril 2008 dans un milieu empierré après arrachage de frênes, rappelant fortement *M. vaporaria* var. *tholiformis*. Ce taxon n'est plus retenu dans les études récentes, il semble s'agir d'une forme luxuriante de *M. importuna*, comme nous l'indique M. Philippe Clowez, que nous remercions vivement.