



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

Leucocoprinus griseofloccosus Lagardère & Eyssartier

Dans les cavités très dégradées de troncs ou de souches. Chapeau 5-12 mm, blanc, couvert chez les jeunes exemplaires par un voile farineux gris pâle, gris ochracé à gris lilac, puis se morcelant pour former de petits flocons fugaces chez les adultes. Lames blanches. Stipe blanc, pruineux, portant un anneau fragile concolore parfois teinté de grisâtre au bord. Odeur et saveur sans particularité. Spores 5,5-7,5 x 3,5-4 µm. Cheilocystides lagéniformes à clavées avec un col plus ou moins long et tortueux.

A ne pas confondre avec *L. cygneus* qui possède un chapeau blanc soyeux sans voile coloré, et des cystides sans col.

Cette petite espèce a été récemment décrite (2016) suite à deux récoltes réalisées dans le département des Landes dans des troncs pourrissants d'aulnes. C'est dans les mêmes conditions que nous avons observé nos exemplaires sur la commune de Montendre, mais au creux d'une souche de bouleau. Nous avons dû déplacer délicatement (vu leur fragilité) les champignons, l'accès étant impossible pour réaliser des photographies in situ. Les chapeaux atteignaient 12 mm au maximum, et les spores contrôlées mesuraient 5,8-6,5 x 3,7-4 µm.

Biblio : Bulletin SMF 132 p. 105-114 (2016).



