



Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella ephemera A.H. Sm.

Dans les milieux boueux. Chapeau 0,5-2 cm, hygrophane, ocre brun à ocre fauve, puis ochracé grisâtre, plus ou moins couvert d'un léger voile fibrilleux. Lames pâles puis brunâtres. Stipe blanc blanchâtre, fibrillo-laineux sous une zone cortiniforme souvent présente. Spores 8-10 x 5-6 μm avec un pore germinatif. Cheilocystides clavées à fusiformes ventrues dont le sommet est obtus à utrifforme, avec un dépôt mucoïde au sommet qui se teinte en vert dans l'ammoniaque.

Durant presque deux décennies, nous avons baptisé ces psathyrelles *P. lutensis*, faute de mieux avec la littérature à notre disposition. Il faut avouer que *P. ephemera* n'est pas présenté dans la littérature couramment utilisée (cf. la bibliographie où elle a été publiée...), et c'est une nouvelle fois l'ADN (cf. photographies ci-dessus à gauche et page 3, récolte réalisée en septembre 2019 à Saintes) qui nous a remis dans le droit chemin, notamment grâce au concours de M. Daniel Deschuyteneer, infatigable spécialiste du genre que nous remercions vivement.

Dans la région, cette espèce se rencontre dans les zones exondées où elle est présente entre les mois de mai et d'octobre, parfois également lors d'hivers doux ; nous l'avons observée par exemple à La Gripperie St Symphorien, Fontcouverte et Les Gonds.

Biblio : Smith, A.H. 1972, the North American species of Psathyrella, memoirs of the New York Botanical Garden - Bull. AMFB 13/2020.



