



Ordre : *Russulales*

Famille : *Russulaceae*

Russula amarissima Romagnesi & Gilbert

Nom français : Russule très amère

Sous feuillus ou conifères. Chapeau 5-12 cm, violet pourpre, rouge pourpré, rouge noirâtre ou violacé, parfois rouge vif, plus ou moins marbré de cuivré jaunâtre, cuticule peu séparable. Lames blanc crème avec l'arête teintée de safran ou de rouge. Stipe très ferme, blanc, souvent teinté de rose sur un côté, jaunissant à brunissant. Odeur fruitée. Chair dure, jaunissante, en général nettement amère. Gaïac vif et rapide sur stipe et lames, Fer orangé. Sporée 2a. Spores subglobuleuses ornées de fines verrues plus ou moins reliées.

Avec une chair très ferme, à comparer avec *R. lepida* qui possède une saveur mentholée.

Russule rarement signalée dans la région, nous l'avons rencontrée à quelques rares reprises entre les mois de juillet et d'octobre, par exemple en forêts de La Braconne et de Port d'Envaux. Sur le terrain, la saveur fortement amère (caractère peu banal dans ce genre), la fermeté et le roussissement de la chair sont les premiers éléments pouvant faire penser à cette espèce.

Biblio : littérature courante - Russules Romagnesi - *Russula* Sarnari.

