



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## *Leucoagaricus rhodelephantinus* Boisselet & Eyssart.

Dans la litière de conifères ou feuillus. Chapeau 1-3(4) cm, d'abord campanulé puis plan-convexe et nettement mamelonné, radialement couvert de mèches rose crème à brun-roux sur fond blanc. Lames blanches. Stipe blanc, un peu jaunissant à la manipulation ; anneau laineux, fragile, restant souvent accroché à la marge du chapeau. Odeur et saveur sans particularité. Cuticule sans réaction sous l'effet de l'ammoniaque. Spores 4,8-6 x 3-4  $\mu\text{m}$ . Cheilocystides cylindriques à légèrement clavées.

Espèce récemment décrite, probablement peu fréquente, dénichée en octobre 2022 en bordure d'un tas de feuilles et d'aiguilles pourrissantes dans les bois de St Augustin. Les spores contrôlées mesuraient 5-5,5 x 3-3,8  $\mu\text{m}$ .

Biblio : Bull. SMF 133 (3-4), p. 263-272 (2017) - GEPR 4 p. 332 sous le nom erroné de *L. erioderma*.

*Fiche réalisée en décembre 2022 par Patrice TANCHAUD*