



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

## *Rhodocybe parilis* (Fr.) Singer

Sur sol sablonneux, en milieux herbeux ou sous conifères. Chapeau 2-5 cm, gris-brun, rugueux et parfois craquelé à maturité. Lames gris brunâtre, décurrentes. Stipe subconcolore au chapeau. Odeur et saveur sans particularité à légèrement raphanoïdes. KOH nul. Spores 5-6,5 x 4,2-5(5,5) µm, finement bosselées.

A comparer avec :

- *Clitocella popinalis* (syn. *R. popinalis*) : espèce sosie, KOH brun-rouge sur cuticule et chair, saveur très amère, spores similaires ;
- *Clitopilus blancii* (syn. *R. blancii*) : chapeau crème blanchâtre à maturité, saveur amère, spores 5,5-6,5 x 3-3,5 µm ;
- *Clitocella fallax* (syn. *R. fallax*) : chapeau crème blanchâtre, saveur légèrement farineuse à amère, spores 6-7 x 3,5-4,5 µm.

Nous avons longtemps hésité pour adopter le binôme ici décrit, mais le comparatif des espèces citées ci-dessus nous conforte dans notre choix. Ces exemplaires ont été récoltés en octobre 2012 sur l'île de Ré, les spores contrôlées mesuraient 5,5-6,5 x 4,2-4,7 µm.

Biblio : Cetto n° 2315 - Pilzk. 1, E. Ludwig.

*Fiche réalisée en août 2022 par Patrice TANCHAUD*