



Ordre : Agaricales

Famille : Secotiaceae

## *Leucoagaricus ionidicolor* Bellù & Lanzoni

En forêt de feuillus ou conifères, sur sol riche dans l'humus. Chapeau pourpre violacé, finement écaillé. Lames blanches à blanc crème. Stipe blanc-rose, vite envahi de rose pourpré sur la longueur ; anneau mince à marge crénelée, avec le dessous concolore au chapeau. Odeur et saveur sans particularité. Réaction verte de la cuticule sous l'effet de l'ammoniaque. Spores 5-6,5(7) x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées à légèrement ventrues.

Espèce bien caractérisée, voir néanmoins la fiche de *L. ammovirescens* pour les espèces pouvant présenter des teintes pourpre violacé rose. Nous y ajouterons *L. idae-fragum* aux couleurs rose framboise avec des spores de dimensions supérieures.

Belle et rare lépiote que nous avons eu le plaisir d'observer à plusieurs reprises, entre les mois de septembre et janvier, sous notre hangar, lieu de stockage de bois avec de nombreux restes jonchant le sol. Les spores contrôlées mesuraient 5-6,5 x 3,2-3,8 µm.

Biblio : DM HS n° 3 - Lepiota s.l. Candusso & Lanzoni - GEPR.

*Fiche réalisée en décembre 2024 par Patrice TANCHAUD*









