



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Cortinariaceae*

***Cortinarius metarius*** Kauffman (Nouveau nom de genre : *Calonarius*)

Synonyme : *C. barbarorum*

Sous pins et épicéas. Chapeau jaune orangé à orangé roux. Lames bleu lilas puis rouillées à maturité. Stipe blanchâtre, bleuté au sommet dans la jeunesse, bulbe marginé à bord roussissant; mycélium blanc. Chair blanchâtre, légèrement bleue au sommet du stipe. Odeur faible ou de pâtisserie, saveur douce. KOH rose à rouge acajou sur la cuticule, rose-rouge sur le bulbe, faible sur la chair. Spores 10-11,5 x 6-7,5  $\mu\text{m}$ .

Dans la même Section, avec la même écologie et un chapeau jaune, envisager *C. barbaricus* qui possède des spores légèrement supérieures (12-13 x 7-8,5  $\mu\text{m}$ ). Sous feuillus, voir par exemple la fiche de *C. cisticola*.

Espèce de la Section *Calochroi* assez bien caractérisée, notre récolte a été réalisée en forêt mixte, en novembre 2011, en forêt de la Coubre. L'odeur était faible et sans particularité, les spores contrôlées mesuraient 9-11,5 x 6-6,5  $\mu\text{m}$ .

Biblio : ADC Bidaud et al. - GEPR.

*Fiche réalisée en février 2025 par Patrice TANCHAUD*