



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

Inocybe helobia (Kuyper) Bandini, B. Oertel & U. Eberh.

Synonyme : *I. lacera* var. *helobia*

Sous feuillus en milieux humides, marécageux ou tourbeux. Chapeau 1-2(3) cm, brun roussâtre, feutré à légèrement écailleux, avec le centre généralement mamelonné et plus sombre. Lames à reflets olivâtres, parfois vineux avec l'âge. Stipe subconcolore au chapeau. Spores 10,5-14(18) x 5,5-7 µm, à contour irrégulier ondulé, non ou peu bosselées. Cheilocystides plus ou moins ventrues, assez courtes et à paroi épaisse.

Séparer les différentes variétés ou formes d'*I. lacera* n'est pas souvent chose aisée, celle-ci, récemment élevée au rang d'espèce, semble néanmoins assez bien typée par son écologie, sa silhouette gracile, son chapeau mamelonné, ses spores et ses cystides.

Attention également à *I. pluppiana*, véritable sosie, qui se distingue par une taille supérieure (15-50 mm) et des spores subtilement plus anguleuses.

Notre récolte a été réalisée en août 2015, sur bord de cours d'eau en milieu siliceux, dans les bois de Montendre. Le chapeau du plus gros exemplaire atteignait 13 mm, les spores observées mesuraient 10-12,5 x 5-5,5 µm.

Biblio : DM n° 108 p. 25 - Guida alla determinazione dei funghi vol. 3, Inocybe Stangl - Mycologia Bavarica, Band 20, 2020.