



Ordre : *Cortinariales*

Famille : *Inocybaceae*

## *Inocybe terrifera* Kühner

Sous feuillus, plutôt sur sol argilo-calcaire. Chapeau beige ochracé grisâtre plus ou moins couvert de voile ou squamules blancs, souvent souillé de terre. Lames beiges puis ochracées. Stipe blanchâtre, puis gris ochracé, rayé à fibrilleux, non ou peu bulbeux. Pas d'odeur particulière. Spores 8-10 x 5-7  $\mu\text{m}$ . Cheilocystides ventruës à parois 1-2  $\mu\text{m}$ .

A comparer avec :

- *I. splendens* (taxon parfois synonymisé, mais semble-t-il abusivement ?) : trapu, chapeau plus sombre, stipe blanc, souvent avec un bulbe marginé, parois des cystides un peu plus épaisses (2-3  $\mu\text{m}$ ) ;
- *I. phaeoleuca* (syn. *I. splendens* var. *phaeoleuca*) : élancé, chapeau nu et plus sombre, stipe blanc, cystides à parois plus épaisses (2-4  $\mu\text{m}$ ).

Cet inocybe semble peu fréquent, c'est l'été et l'automne que nous l'avons observé à quelques occasions, bien dans son écologie de prédilection, sous feuillus en milieu frais.

Biblio : DM 108 p. 58.