



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Leucopaxillus cutefractus*** Noordeloos

Synonymes : *L. albissimus*, *L. cerealis* - Synonymes possibles (ou très difficiles à distinguer) : *L. paradoxus*, *L. malenconii*, *L. monticola*, *L. barbarus*

Nom français : Leucopaxille craquelé


En forêt. Chapeau charnu, blanchâtre à ochracé, plus ou moins craquelé, marge enroulée. Lames blanc crème, décurrentes, souvent anastomosées vers le stipe. Stipe blanc. Odeur aromatique nette, saveur douce. Spores 6,5-8,5 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides (ou poils d'arête) plus ou moins présentes.

A comparer surtout avec :

- *L. agrippinae* : véritable sosie, seule espèce du genre sans boucles ;
- *L. alboalutaceus* : chapeau blanc à centre ochracé, odeur farineuse, saveur farineuse à légèrement amère, spores 4-5 x 3-4 µm.

Cette espèce est moyennement fréquente à l'intérieur des terres, par contre nous l'observons chaque automne ou début d'hiver sur le littoral, par exemple en forêt de la Coubre et sur l'île de Ré. Nous avons pu constater que les chapeaux sont plus ou moins craquelés selon les conditions météorologiques et nous plaçons l'ensemble de nos récoltes sous le binôme ici décrit.

Biblio : littérature courante - DM HS n° 2 - Pilzk. 1 - Funga nordica.







*cheilos*