



Ordre : Cortinariales

Famille : Hymenogasteraceae

Alnicola escharioides (Fr.: Fr.) Romagn.

Sous aulnes. Chapeau blanchâtre à crème ochracé, couvert d'un voile laineux-squamuleux abondant appendiculant nettement la marge. Lames ochracées. Stipe fibrillo-floconneux avec une zone annulaire. Saveur amère. Spores 8,5-11 x 5-6,5 µm, cheilocystides lagéniformes à col variable, parfois cloisonnées.

A comparer avec :

- *A. luteolofibrillosa* : sosie lié à l'aulne vert (en haute montagne) ;
- *A. citrinella* : chapeau pâle peu voilé et non strié, saveur amère, cheilocystides à long col issu d'une base utrifforme.

A noter que le binôme adopté ici (parfois écrit *escharoides*) est pris au sens originel de Fries (puis de Kühner et de P.-A. Moreau), car l'interprétation d'autres auteurs correspond à *A. citrinella*.

Dans les stations humides de la région, avec présence d'aulne glutineux, nous rencontrons occasionnellement des exemplaires abondamment voilés comme ici, mais jamais en grand nombre. Nos récoltes proviennent par exemple de Ste Gemme et Fontcouverte.

Biblio : Clé du genre *Alnicola* P.-A. Moreau - GEPR - Sterbeeckia 31: 3-15 (2012).