



Ordre : *Tricholomatales*

Famille : *Tricholomataceae*

## ***Omphalina pyxidata*** (Bull. : Fr.) Quélet

Nom français : Omphale en coupe

A terre, dans les pelouses dunaires et de l'intérieur. Chapeau brun rougeâtre, roux brunâtre à ochracé roussâtre en séchant, marge striée. Lames crème ochracé. Stipe glabre, subconcolore au chapeau. Spores 7-9,5 x 3,5-6 µm, cheilocystides tortueuses, ramifiées ou coralloïdes. Cf. fiches *O. hepatica* et *O. galericolor* pour les espèces proches.

*O. pseudomuralis* est un autre taxon, peu connu, qui semble bien délicat à séparer ; il est décrit avec un chapeau brun pourpré sombre, couleur que nous retrouvons sur le peuplement photographié ci-dessus à gauche...

Attention également à une rare espèce, *Leucoinocybe taniae* (syn. *Clitocybula taniae*, *Pseudoomphalina flavoaurantia*), qui pousse en milieux sablonneux et herbeux, à chapeau omphaloïde, strié, brun à fauve orangé avec le centre plus sombre, lames décurrentes, sans odeur particulière, spores 6-8 x 5-7 nettement amyloïdes, et présente des cystides lagéniformes à long col sur les lames, le stipe et la cuticule.

Espèce assez fréquente sur l'ensemble de notre littoral atlantique. Nous l'avons également rencontrée à l'intérieur des terres, dans le secteur de Ste Gemme.

Biblio : littérature courante.





