



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Otideaceae*

Sowerbyella meridionalis E. Rubio, L. Sánchez, J. Bometón & C. Roqué

Souvent grégaire, sous cyprès, pins ou chênes verts, méditerranéo-atlantique. Apothécie 1-4 cm, hyménium jaune à jaune orangé, face externe subconcolore. Stipe plus ou moins radicaux. Présence possible d'un latex jaune à la cassure. Spores 9-12 x 5-6,5 µm, elliptiques, biguttulées, ornées de courtes crêtes interconnectées.

A comparer avec *S. brevispora*, espèce des pays nordiques souvent trouvée sous épicéas (parfois sous feuillus), ses spores de dimensions équivalentes sont formées de verrues isolées.

Les deux récoltes que nous présentons ont été réalisées en novembre et décembre 2009, sous *Cupressus macrocarpa*, dans les secteurs de Rivedoux et La Flotte, sur l'île de Ré. La première (à gauche) présentait six apothécies serrées les unes contre les autres mesurant 10 mm maximum, alors que pour la seconde (à droite) il n'y avait que deux apothécies non collées, la plus grande atteignant 27 mm. Les spores de ces deux récoltes mesuraient 11-11,5 x 5,5-6 µm.

Biblio : Harmaja 184 - Moravec, Mycologia Helvetica vol 1 n° 6, 1985, p 427-442 - Bull. SMF 126 (1) p. 17-24 - Bull. SMMA 28 p. 18 - Ascomycete.org, 13 (4) : 133-143 (2021).

