



Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Tarzetta melitensis Sammut & Van Vooren

Sous chênes. Apothécies de petite taille, 7-11 mm, en forme de coupe. Hyménium blanc crème, marge crénelée. Face externe gris-brun à beige, pustuleuse. Stipe absent ou très court. Spores 23-26,5 x 12,2-13,4 µm, hyalines, avec deux guttules et d'autres plus petites.

Avec une écologie similaire, à comparer avec *T. quercus-ilicis* et *T. cupularis* (normalement avec un court stipe), espèces plus ou moins sosies bien délicates à séparer avec certitude sans recours à une étude ADN.

Les exemplaires présentés ci-dessus ont été observés en novembre 2024 sur l'île de Ré, sous chênes verts, et face aux difficultés de détermination des taxons de ce genre, nous avons procédé à un séquençage, avec un résultat qui semble sans ambiguïté pour retenir *T. melitensis*. Nous remercions vivement le projet Funif-Col du Museum National d'Histoire Naturelle de Paris qui a procédé à cette étude phylogénétique.

Page 2, nous plaçons deux autres récoltes réalisées par le passé sur cette même île, mais sous toutes réserves évidemment...

Biblio : Ascomycete.org, 11 (6) : 309-334 (2019).

