




Ordre : Pezizales

Famille : Pyronemataceae

Tricharina hiemalis Chin S. Yang & Korf

Sur le sol, souvent en milieu sablonneux. Apothécies 2-8 mm plus ou moins enfouies. Hyménium beige ochracé, marge et face externe couvertes de poils bruns. Spores 14-18 x 7-11 µm lisses et sans gouttelettes, Qm (1,6)1,7-1,8(2,1).

A comparer avec quelques espèces plus ou moins similaires et ingrates à distinguer, souvent un recours au séquençage ne serait pas superflu :

- *T. subhiemalis* : spores 14-16,5 x 9,5-11,5 µm, la distinction se jouerait sur un quotient moyen des spores inférieur, Qm de (1,3)1,5-1,6(1,7) ;
- *T. tophiseda* : spores avec quelques guttules ou granules aux pôles ;
- *T. striispora* : spores d'aspect strié (paroi cyanophile finement ornée de verrues alignées longitudinalement ;
- *Ascorhizoctonia praecox* : dans les endroits incendiés.

Nous remercions vivement M. Uwe Lindemann, spécialiste du genre, pour ses précieux conseils à l'occasion de la récolte présentée ci-dessus et page 2, pour laquelle le binôme *T. hiemalis* semblerait être le plus approprié. Nous avons observé ces nombreux exemplaires en janvier 2024 sur l'île de Ré, les spores mesuraient 16,3-18,8 x 9,5-10,8 µm (Qm 1,6-1,9). Nous plaçons page 3, avec encore plus de réserves, deux autres récoltes réalisées à l'intérieur des terres, baptisées à l'époque *T. ochroleuca*, binôme reconnu aujourd'hui comme étant un nomen dubium.

Biblio : Ascomycetes.org vol. 11 fasc. 5 et vol. 14 fasc. 4 & 5.



