



Ordre : Amanitales

Famille : Amanitaceae

Amanita albogrisescens Contu

Synonyme : *A. separata* (nom invalide)

Sous feuillus. Chapeau brun bistre sombre parfois grisonnant à maturité, plus ou moins avec des plaques de voile, marge fortement striée. Lames blanches. Stipe blanc, un peu pelucheux. Volve blanche, membraneuse, vaginée et engainante, assez haute. Spores 9-12 x 7,5-9,5 µm, ellipsoïdales.

A noter l'existence de différentes formes, *f. pseudolactea* (entièrement blanc), *f. cinereifolia* (chapeau gris plombé à argenté, lames grises), *f. subglobispora* (spores subglobuleuses).

Cf. fiche *A. argentea* pour les espèces ressemblantes poussant sous feuillus, sous conifères voir par exemple la fiche de *A. supravolvata*.

Cette amanite semble peu fréquente dans la région, nous l'avons observée en Charente-Maritime et Charente, sous chênes et charmes. De nouvelles observations avec séquençages à la clé ne seraient pas superflues.

Biblio : Boll. Assoc. micol. ecol. Romana, 46 (1), p. 8 (1999) - Bull. SMF 133 (1-2), p. 67-141 (2017).

Fiche réalisée en août 2020 par Patrice TANCHAUD

