



Ordre : *Tremellales*

Famille : *Tremellaceae*

Phaeotremella foliacea (Persoon) Wedin, J.C. Zamora & Millanes

Sur bois, surtout de feuillus. Fructification foliacée, molle et cartilagineuse, ondulée, cannelle teinté d'incarnat, brun-roux, puis brun rougeâtre à brun sombre noirâtre. Spores 7-9(13) x 5-8(9) µm (selon les ouvrages).

Nous nommons nos récoltes à l'aide de la littérature citée ci-dessous. Mais lorsque nous consultons des documents spécialisés (« *Studies in the Genus Tremella*, Chee Jen Chen, 1998 » et « *British Tremella species*, Peter Roberts 1995 »), nous nous apercevons que l'étude de ce genre n'est pas aisée et ne se limite pas aux quelques espèces que nous trouvons dans les ouvrages courants. Néanmoins, nous pouvons lire qu'un grand nombre d'espèces qui y sont présentées ont été récoltées dans des pays bien lointains et souvent sur d'autres continents, ce qui nous renforce dans l'immédiat à rattacher nos récoltes, réalisées sur feuillus dans les secteurs de Saintes et Souligonne, au taxon ici présenté.

Biblio : littérature courante - BK2 27 - Hyménomycètes de France Bourdot & Galzin.