



Ordre : *Entolomatales*

Famille : *Entolomataceae*

Clitocella nigrescens (Maire) Consiglio

Synonymes : *Rhodocybe nigrescens*, *R. cupressicola*, *R. malenconii*, *R. obscura* ss. *auct.*

En milieu dunaire, mais aussi sous différentes essences telles que *Cupressus*, *Juniperus*, *Pinus*, *Eucalyptus*. Chapeau ocre beige à gris ochracé, parfois blanchâtre, souvent tacheté de gris-noir. Lames plus ou moins décurrentes, gris jaunâtre puis rosâtres. Stipe blanchâtre souvent profondément ensablé. Odeur un peu farineuse, mais rappelant aussi l'odeur d'huitre fraîche. Saveur amère. Sporée rose. Spores 6,5-9,5 x 5,5-7 µm. Cheilocystides absentes.

A noter l'existence de :

- *Lyophyllum littorale* : dans les dunes et véritable sosie vu de dessus, ses lames sont peu décurrentes et sa sporée est blanche ;
- *C. obscura* : sous épicéas en montagne, chapeau et lames gris foncé à noirâtres, cheilocystides filiformes.

Par le passé, ces rhodocybes ont souvent fait l'objet de controverse, mais l'étude récente citée ci-dessous à l'appui de séquençages mérite de clarifier la situation. Sans être fréquente, cette espèce est visible presque tous les ans dans notre secteur, entre novembre et janvier, surtout dans la dune et sous cyprès. Nous l'avons occasionnellement observée sur l'île d'Oléron et à la Bouverie, mais bien plus souvent sous les nombreux cyprès de l'île de Ré et de l'île d'Aix.

Biblio : Micol. e Veget. Medit. 23 (1) : 31-50 (2008) - Persoonia 50, 2023 : 123-157.



Ile de Ré



