

Ordre : Agaricales

Famille : Psathyrellaceae

Psathyrella piluliformis (Bull. : Fr.) Orton

Synonymes : *P. hydrophila*, *P. subpapillata*

Nom français : Psathyrelle hydrophile

En touffe ou grégaire sur bois, surtout de feuillus. Chapeau brun rougeâtre à brunâtre, hygrophane et séchant en ocre jaune terne par le centre, marge munie d'un voile membraneux pâle, puis noirâtre par les spores. Lames brunes à maturité. Stipe blanc ochracé. Spores 5-6 x 3-4 µm avec pg (pore germinatif) nul ou peu visible. Cheilocystides et pleurocystides variables mais sans rostre. A comparer avec :


- *P. laevissima* : voile absent ou presque, chapeau moins hygrophane, pleurocystides avec un rostre au sommet ;
- *P. hydrophiloides* : croissance isolée, chapeau brun rougeâtre sombre, spores avec pg très distinct (1-1,5 µm) ;
- *P. obscurotristis* : chapeau plus sombre non hygrophane, odeur d'amande amère, pleurocystides avec un rostre et spores sans pore germinatif.

Espèce très fréquente et visible à tout moment de l'année, dès les mois d'été après les pluies et parfois encore l'hiver lorsque la température le permet.


Biblio : littérature courante.

cheilos





cheilos



cheilos

