



Ordre : *Pezizales*

Famille : *Pyronemataceae*

## *Geopyxis majalis* (Fr.) Sacc.

Sous conifères parmi les aiguilles (souvent de pin), au printemps. Apothécies 10-30 mm, cupuliformes puis étalées à maturité, sessiles à brièvement stipitées. Hyménium plus ou moins orangé à rose saumoné, marge blanchâtre typiquement crénelée ; face externe concolore, un peu farineuse et pâlissant en séchant. Spores (14)16-18(19) x (7)8-9(9,8)  $\mu\text{m}$ , hyalines, lisses et non guttulées, avec une périspore visible dans l'asque. Asques avec crochet à la base. Paraphyses filiformes, plus ou moins septées.

A comparer avec :

- *G. alpina* : parmi les mousses en bordure de ruisseau dans les endroits frais en altitude, spores 15-17 x 8-10  $\mu\text{m}$  (légèrement plus larges) ;
- *G. carbonaria* : en milieu brûlé, couleur moins vive ;
- *G. foetida* : nette odeur désagréable, nettement stipité, spores plus petites.

Cet ascomycète est peu fréquent et très rarement signalé, nous l'avons rencontré en mars 2026 en forêt de La Coubre, les spores contrôlées mesuraient (14)15-16,5(17) x (7)7,5-8  $\mu\text{m}$ .

Biblio : Discomycètes de France, p. 112, Grelet (sous le nom de *G. maiialis*) - Ascomiceti d'Italia, Medardi - Cahiers FMBDS, contribution à la connaissance des Pézizales en Auvergne-Rhône-Alpes.



